

## Aranyszínű sárgaság elleni védekezés 2026.

Termelői tájékoztató

2026. május 22.

Szőlőkabóca elleni védekezési terv

Az amerikai szőlőkabóca születésekor még nem hordozza az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma betegséget. A beteg tőkék zöld részeinek szivogatásával veszi fel azt, válik hordozóvá és terjeszti tovább a betegséget egyik tőkéről a másikra.

**Törzstisztítás:** legkésőbb májusban történjen meg. A kabóca először a törzshajtásokat szivogatja, alulról indul.


A lárvák megjelenése június elejétől várható. A Pannonhalmi Borvidéken helyenként már találkozni lehet L1-es lárvákkal. L1, L2 és L3 lárvastádiumig nem fertőz a rovar. Ez alatt (június elejétől július közepéig) **2 védekezés** szükséges.

**L2-L3 lárvá állapot elleni védekezés várható időpontja: június eleje**

**L3-L5 lárvá állapot elleni védekezés várható időpontja: június vége/július eleje**

**A PERMETEZÉS IDŐPONTJÁRÓL FELHÍVÁS ÉRKEZIK A NÖVÉNYVÉDELMI HATÓSÁGTÓL A HEGYKÖZSÉGHEZ, MELYET TOVÁBBÍTUNK A TERMELŐK FELÉ.**

A csontfehér színű lárvák az alsó levelek fonákán keresendők. Ismertető jel: a potroh végén lévő 2 fekete pont.





**A L1 lárva megjelenése** általában a virágzáskor történik, ezért

- virágzáskor narancsolaj tartalmú készítménnyel permetezzünk. A narancsolaj is csak méhkímélően juttatható ki, azaz napnyugta előtt 1 órával kezdhető meg a permetezés és 23 óráig be kell fejezni.

A további (virágzáson túli) kezelések bármelyik engedélyezett szerrel történhetnek.

**Július második felében** sárga ragacslapok kihelyezése az ültetvényben a kifejlett egyedek megfigyelésére. 4 db kabóca/ ragacslap/ hét esetén még javasolt szüret előtt is permetezés (**3. permetezés**). FONTOS! Az élelmezésügyi várakozási idő figyelembe vételével történjen a szerválasztás.

**A rovar állapot (imágó) elleni védekezés várható időpontja: július vége/augusztus.**

Kifejlett amerikai szőlőkabóca:





Mérete: 5 mm


# Az amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*) különböző fejlődési alakjai




Az amerikai szőlőkabóca életciklusa



- évente egy nemzedék
- tojás tel a kéregrepedésekben
- éjszakai aktivitás
- levélfonákon tartózkodás jellemző
- lárvák elsősorban az alsó leveleken
- öt lárvastádium
- L1-L3 jellemzően egyszínű, sárgás
- L4-L5 szárnykezdeményes nimfák, mintázat megjelenik
- minden lárvastádium potrohvégén két fekete folt, illetve sötét serték
- imágó testhossza is csupán 5-6 mm
- imágó szárnymintázat alapján megbízhatóan azonosítható
- szárnyvégeken sötét foltok
- imágó potrohvégén négy sötét sertecsomó



Az amerikai szőlőkabóca életciklusa és permetezési terv:



Minden rovarirtó szeres permétezés a szomszédok által összehangoltan, minél rövidebb időn belül (néhány napon belül) történjen, hogy a rovarok ne tudjanak elrepülni a permetszer elől.

Az aranszínű sárgaság tüneteinek várható megjelenése: július második felétől.

Aranszínű sárgaság fehér szőlőtőkén:



Levelek a fonák felé pöndörödnek háromszög alakban, sárgulnak majd elszáradnak. Nem csak a hajtásvégeket érinti az elszíneződés, hanem az egész hajtást. A levelek későn hullanak le. Termés nincs vagy kevés és elfonnyad. A veszők nem fásodnak be rendesen, zöldek maradnak, elvékonyodnak, gumyszerűvé válnak.

Aranyszínű sárgaság kék szőlőtőkén:



Levelek a fonák felé pöndörödnek háromszög alakban, bordó színűek, elszáradnak. Nem csak a hajtásvégeket érinti az elszíneződés, hanem az egész hajtást. A levelek későn hullanak le. Termés nincs vagy kevés és elfonnyad. A vesszők nem fásodnak be rendesen, zöldek maradnak, elvékonyodnak, gumyszerűvé válnak.

A HNT weboldalán elérhető lesz egy oktatóanyag az aranyszínű sárgaság tüneteinek felismeréséről. Az oktatóanyag elérhetőségéről majd tájékoztatjuk a termelőket e-mailben, a borvidéki weboldalon és facebook oldalon keresztül.

### **PERMETEZÉSI RIADÓ:**

A Növényvédelmi Hatóság folyamatosan figyeli az ültetvényeket, a kihelyezett csapdákat és értesíti a Hegyközséget a permetezés szükségességekor. A Hegyközség e-mailben, a facebook oldalán, a weboldalán és a borvidéki települések önkormányzatain keresztül értesíti a termelőket.

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) országos rajzasi monitoring rendszert működtet és SMS-ben értesíti a hegyközségi nyilvántartásban szereplő termelőket a permetezés szükségességéről.

### **ARANYSZÍNŰ SÁRGASÁG FELDERÍTŐ SZEMLÉZÉS:**

A szőlőtermelők folyamatos önellenőrzés keretében kötelesek megjelölni a betegség tüneteit mutató tőkéket és a rezervoár gazdanövényeket (bálványfa, iszalag stb..) haladéktalanul eltávolítani.

**Amennyiben a fertőzés mértéke meghaladja az ültetvény 20 %-át, kötelesek bejelenteni azt a Növényvédelmi Hatóság és a hegybíró felé is!**

**Növényvédelmi Hatóság felé a bejelentés módja hivatali kapun keresztül:**

epapir.gov.hu

ügyfélfelkapu+ vagy DAP bejelentkezést követően:

Új levél írása (Cégkapuról küldve jelölése opcionális, cég nevében eljárókra vonatkozik)

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek

Ügytípus: Növény- és talajvédelmi feladatok

Címzett: Gy-M-S Vármegyei Kormányhivatal

Tárgy: Arany színű sárgaság gyanú bejelentése

A levélben vagy a csatolmányban kell felsorolni az érintett helyrajzi számokat.

**a hegybíró részére e-mailen: [rozmaring.tunde@hnt.hu](mailto:rozmaring.tunde@hnt.hu)** (termelő neve, telefonszáma, érintett helyrajzi számok)

Ha az ültetvényben a fertőzöttség mértéke nem éri el a 20 %-ot, a termelő köteles eltávolítani a tüneteket mutató tőkék zöld részeit (hogy ne tudják szivogatni a kabócák és továbbterjeszteni a fertőzést).

Hatósági felderítő szemlék:

Július végétől (a látható tünetek megjelenésétől kezdődően) a Növényvédelmi Hatóság és a Hegyközség közös felderítő szemléket tart a teljes Borvidéken. A felderítő szemlék időpontját és az érintett területeket a borvidék weboldalán tesszük közzé.

Amennyiben a hatósági felderítő szemle során bebizonyosodik, hogy a termelő nem tett eleget az önvizsgálati kötelezettségének, 100.000 Ft-tól kezdődő mulasztási bírsággal sújtható.

A nem hegyközségi tag termelőket az önvizsgálat és/vagy a kötelező védekezés elmulasztása esetén a Törvényszék kötelezi kötelezettségük teljesítésére.

További információk az arany színű sárgaságról:

NÉBIH PORTÁL: <https://portal.nebih.gov.hu/fd-betegseg>

HNT: <https://hnt.hu/informaciok/aranyszinu-sargasag>

Pannonhalmi Borvidék: <http://www.pannonhalmiborvidek.hu/hun/>

Használható permetszerek az amerikai szőlőkabóca ellen:

<https://portal.nebih.gov.hu/-/ujabb-rovarolo-szerek-kaptak-engedelyt-az-amerikai-szolakaboca-elleni-vedekezesben>

<https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1504431079/Engedelyezett+rovarolo+szerek.pdf/ff46090e-f6b0-45e7-0845-1383a899b3e2?t=1750927468584>